

Регистрационный номер: ЛСР-002152 / 07

Торговое наименование: РектАктив®.

Международное непатентованное

или группировочное наименование: Каштана конского семян экстракт.

Лекарственная форма: Суппозитории ректальные.

Состав на один суппозиторий:

Активный компонент: Каштана конского семян экстракт (Каштана конского экстракт сухой), содержащий 20 % суммы тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин 50 мг или 100 мг.

Вспомогательное вещество: Жирных кислот глицериды (Витепсол Н 15, Твердый жир Керносол 35) 0,95 г или 0,90 г.

Описание: Суппозитории от светло-коричневого цвета до коричневого цвета торпедообразной формы. На поверхности и на срезе суппозиториев допускаются вкрапления темно-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Слабительное средство растительного происхождения.

Код АТХ: A06AX

Фармакологические свойства: Тритерпеновый сапонин эсцин, содержащийся в экстракте конского каштана стимулирует интерорецепторы слизистой оболочки прямой кишки, вызывая усиление ее перистальтики и быструю эвакуацию каловых масс. Эффект наступает через 5-15 мин после применения суппозитория.

Позывы к опорожнению кишечника прекращаются после акта дефекации.

Препарат не вызывает растяжения стенок прямой кишки, укрепляет и тонизирует гладкую мускулатуру этого органа. При курсовом применении препарат восстанавливает дефекационный рефлекс и нормализует биоритм дефекации.

Показания к применению: Симптоматическое лечение запора, включая привычный и хронический запор, гиптоническую дискинезию толстой кишки (например, у лежачих и пожилых пациентов).

Противопоказания: Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, острый геморрой, острый проктит и парапроктит, спастический запор, опухоли и трещины прямой кишки, выраженное обезвоживание, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы: Препарат применяют ректально (вводят в прямую кишку) 1 раз в сутки за 5-15 мин до запланированного акта дефекации. Чтобы вынуть

суппозиторий из ячейковой упаковки, отломить одну ячейку с суппозиторием по насечке и разъединив края ленты потянуть за них в разные стороны. Суппозиторий ввести в задний проход заостренным концом, по возможности глубоко. Для более удобного введения суппозитория рекомендуется нагнуться, присесть на корточки или лечь на бок, поджав ноги.

Разовая доза для взрослых 50–100 мг 1 раз в сутки; максимальная разовая доза — 300 мг; максимальная суточная доза — 300 мг.

Длительность одного курса лечения препаратом 14 дней. Дальнейшее лечение препаратом возможно после консультации с врачом. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие: Отдельных случаях возможны аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения в прямой кишке. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка: Симптомом передозировки является частый жидкий стул. В этом случае следует прекратить применение препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Данные о случаях взаимодействия с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания: Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 2 недель или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска: Суппозитории ректальные 50 мг и 100 мг. По 5 суппозиториям упаковывают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом. По 1 или по 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения: При температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска: Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителя: ООО «Миллор Групп», Россия 117186, Москва, Нахимовский проспект, д. 22, тел. +7 (499) 390-13-97, 8 (800) 222-42-72, info@millor-group.ru

Производитель: ООО «Альтфарм», 142073, Россия, Московская область, г. Домодедово, д. Судаково, территория вл. Лесное, стр. 106.
Тел./ факс: (495) 234-46-40.